إشعاع الجسم الأسود

* نظرية ماكسويل ← النظرية الموجية الكلاسيكية ← الموجات الكهرومغناطيسية تنشأ عن الشحنات الكهربائية المتسارعة (المتذبذبة)

* الإشارة



* الجسم الأسود المثالي :-

جسم أسود يمتص جميع الأشعة الساقطة عليه ولا يعكس منها شيئاً »
ثم يشعها جميعها ، ويعتمد اشعاعه على درجة حرارته المطلقة .



λ_m : الطول الموجي للإشعاع السائد الذي تكون عنده الطاقة الصادرة عن الجسم الأسود أكبر ما يمكن

λ_o : نقطة تقاطع المنحنى مع محور السينات
عند λ_o يكون الإشعاع (الطاقة) الذي يصدر = صفر

ملاحظة ...	الاستنتاج ...
* بزيادة درجة الحرارة تزداد المساحة تحت المنحنى $T \uparrow \rightarrow A \uparrow$	* بزيادة الحرارة تزداد اجمالي الطاقة الصادرة عن الجسم الأسود لكل وحدة مساحة .
* بزيادة الحرارة تنزاح (λ_m) نحو اليسار	* زيادة الحرارة يزاح الطول الموجي للإشعاع السائد نحو الطول الموجي الأقل ← يزاح نحو الضوء المرئي
* بزيادة الحرارة تنزاح نقطة تقاطع المنحنى مع محور السينات (λ_o) نحو اليسار	* بزيادة الحرارة يزاح الإشعاع نحو الطول الموجي الأقل

Scanned by CamScanner

س/ من خلال دراستك لمنحنى الاشعاع للجسم الاسود (الشدة - الطول الموجي) ، استنتج اشكال باقي المنحنى (موجات الكهرومغناطيسية - التردد) للجسم الاسود

* فشل النظرية الموجية في تفسير اشعاع الجسم الأسود :-

بقول ماكسويل ← تنشأ الموجات الكهرومغناطيسية من الشحنات المتذبذبة

↓

∴ زادت درجة الحرارة ← يزداد تذبذب الشحنات ← f يزداد ← λ يقل

(λ يزداد ← f يقل ← E تقل)

① f ← ∞ ← E بطاقة ∞ ← λ_0 ← صفر

② f = صفر ← E بطاقة = صفر ← λ = ∞

↓

وهذا لا ينطبق على اشعاع الجسم الاسود

س/ فسر كيف فشلت النظرية ؟!!

استطاعت تفسير الاطوال الموجية الطويلة لاشعاع الجسم الاسود ، وفشلت عند الاطوال الموجية القصيرة

المتوقع	النتائج العملية
① λ تقل = 0 ← f يزداد ∞ ← E تزداد ∞	* λ تقل = 0 ← f تقل ← E تقل = 0
② λ تزداد ← f تقل ← E تقل	* λ تزداد ← f تزداد ← E تزداد



Scanned by CamScanner